

Liste rouge des oiseaux des Pays de la Loire – volet populations nicheuses

Janvier 2026

Statut de conservation des populations nicheuses des 209 espèces se reproduisant dans les Pays de la Loire. Une publication plus formalisée et plus complète sera disponible fin 2026 et comprendra l'évaluation des populations hivernantes et migratrices. Les statuts de cette liste rouge sont disponibles sous forme de tableur dans le référentiel accessible sur [cette page](#).

NOM VERNACULAIRE	NOM SCIENTIFIQUE	LR PDL NICHEUR (2014)	LR PDL NICHEUR (2026)	Critères	Changement de catégorie*	Tendance
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i> (Linné, 1758)	NA ^a	NA ^a			
Oie cendrée	<i>Anser anser</i> (Linné, 1758)	EN	VU	D1	Va	↗
Cygne noir	<i>Cygnus atratus</i> (Latham, 1790)	NA ^a	NA ^a			
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i> (J. F. Gmelin, 1789)	NA ^a	NA ^a			
Ouette d'Egypte	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (Linné, 1766)	NA ^a	NA ^a			
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	→
Canard carolin	<i>Aix sponsa</i> (Linnaeus, 1758)	NA ^a	NA ^a			
Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i> (Linné, 1758)	NA ^a	NA ^a			
Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i> Linné, 1758	VU	VU	D1	PC	↘
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	→
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i> Linné, 1758	NT	NT	VU (D1) (-1)	PC	→
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	↗
Canard pilet	<i>Anas acuta</i> Linné, 1758	NA ^b	NA ^b		PC	
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i> Linné, 1758	CR	CR	D	Va	↗
Nette rousse	<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)		EN	CR (D) (-1)	E	↗
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i> (Linné, 1758)	LC	NT	pr. D1	Vd	↘
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)		NA ^b			
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i> (Linné, 1758)	NT	NT	VU (D1) (-1)	PC	↗
Eider à duvet	<i>Somateria mollissima</i> (Linné, 1758)	CR	CR	D	PC	↗
Érismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i> (J. F. Gmelin, 1789)	NA ^a	NA ^a			
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i> (Linné, 1758)	NE	DD		NVm	?
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i> (Linné, 1758)	NE	DD		NVm	?
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i> (Linné, 1758)	LC	DD		NVcd	?
Faisan vénéré	<i>Syrnaticus reevesii</i> (J. E. Gray, 1829)	NA ^a	NA ^a			
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i> Linné, 1758	NE	DD		NVm	?
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	?
Martinet noir	<i>Apus apus</i> (Linné, 1758)	LC	VU	A2ab	Vd	↘
Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i> (Linné, 1758)	CR	CR	D	PC	↘
Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i> (Linné, 1758)	NA ^b	NA ^b		PC	
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	↘
Pigeon biset domestique	<i>Columba livia "urbicum"</i> Gmelin, 1789	LC	NE		NVe	
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	?
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	↗
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i> (Linné, 1758)	NT	VU	A2ab	Vd	↗
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)	LC	LC		PC	↘
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i> Linné, 1758	DD	LC		NVca	?
Râle des genêts	<i>Crex crex</i> (Linné, 1758)	EN	CR	A2ab	Vd	↘
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i> (Linné, 1766)	CR	CR	D	PC	↘
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	↘
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	↘
Marouette de Baillon	<i>Zapornia pusilla</i> (Pallas, 1776)	NA ^b	CR	D	Vp	?

NOM VERNACULAIRE	NOM SCIENTIFIQUE	LR PDL NICHEUR (2014)	LR PDL NICHEUR (2026)	Critères	Changement de catégorie*	Tendance
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	LC	LC		PC	?
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	?
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i> C. L. Brehm, 1831	VU	EN	D	Vd	↗
Œdicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	?
Huîtrier pie	<i>Haematopus ostralegus</i> Linné, 1758	EN	EN	CR (D) (-1)	PC	↗
Échasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	↗
Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	↗
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i> (Linné, 1758)	LC	VU	C1	Vd	↘
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	LC	NT		NVcd	?
Gravelot à collier interrompu	<i>Anarhynchus alexandrinus</i> (Linnaeus, 1758)	VU	EN	D	Vd	↗
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i> (Linné, 1758)	EN	EN	D	PC	↗
Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i> (Linné, 1758)	VU	EN	B(1+2)ab(v) C2(a)(i)	Vd	↘
Combattant varié	<i>Calidris pugnax</i> (Linné, 1758)	NA ^b	NA ^b		PC	
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i> Linné, 1758	NT	VU	D1	Vd	?
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i> (Linné, 1766)	CR	CR	D	PC	→
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linné, 1758)	EN	NA ^b		NVe	?
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i> (Linné, 1758)	LC	VU	C1	Vd	↘
Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i> (Linné, 1758)	CR	CR	B(1+2)ab(v) D	PC	↘
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linné, 1766)	LC	LC		PC	↗
Mouette mélanocéphale	<i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820	LC	LC		PC	↗
Goéland marin	<i>Larus marinus</i> Linné, 1758	NT	NT	VU (D1) (-1)	PC	↗
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	NT	VU	A2ab C1	NVm	↘
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840	NT	VU	D1	Vd	↗
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i> Linné, 1758	VU	VU	B(1+2)ab(v)	PC	↘
Sterne caugek	<i>Sterna sandvicensis</i> Latham, 1787	VU	NT	VU (D2) (-1)	Va	↗
Sterne élégante	<i>Sterna elegans</i> Gambel, 1849		NA ^b			
Sterne naine	<i>Sternula albifrons</i> (Pallas, 1764)	NT	VU	D(1+2)	Vd	→
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i> Montagu, 1813	RE	RE		PC	
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	↗
Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763	NA ^b	NA ^b		PC	
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i> (Pallas, 1811)	VU	VU	D2	PC	↗
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815)	NA ^b	NA ^b		PC	→
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i> (Linné, 1758)	EN	CR	C1	Vd	↘
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i> (Linné, 1758)	CR	CR	D	PC	↗
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i> (Linné, 1758)	LC	LC	NT (pr. D1) (-1)	PC	↗
Cormoran huppé	<i>Phalacrocorax aristotelis</i> (Linné, 1761)	EN	EN	CR (D) (-1)	PC	↗
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	↗
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i> (Linné, 1766)	NA ^b	NT	VU (D1+2) (-1)	Vp	↗
Ibis sacré	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (Latham, 1790)	NA ^a	NA ^a			
Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i> Linné, 1758	VU	LC		Va	↗
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i> (Linné, 1758)	CR	CR	B1ab(v)	PC	↘
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linné, 1766)	CR	CR	D	PC	?
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linné, 1758)	NT	LC		Va	↗
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	CR	CR	C1 D	PC	↘
Héron garde-bœufs	<i>Bubulcus ibis</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	↗
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	↘
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i> Linné, 1766	LC	VU	A2ab C1 D1	Vd	↘
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i> (Linné, 1766)	LC	NT	VU (C1) (-1)	Vd	↘

NOM VERNACULAIRE	NOM SCIENTIFIQUE	LR PDL NICHEUR (2014)	LR PDL NICHEUR (2026)	Critères	Changement de catégorie*	Tendance
Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i> (Linné, 1758)	VU	NT	pr. D1	Va	↗
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i> (Linné, 1758)	NA ^b	CR	D	Vp	↗
Élanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i> (Desfontaines, 1789)	NA ^b	NT	VU (D1) (-1)	Vp	↗
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i> (Linné, 1758)	LC	DD		NVcd	?
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i> (J. F. Gmelin, 1788)	EN	EN	CR (D) (-1)	PC	↗
Aigle botté	<i>Aquila pennata</i> (J. F. Gmelin, 1788)	NA ^b	NA ^b		PC	
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	→
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i> (Linné, 1758)	NT	NT	VU (D1) (-1)	PC	→
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i> (Linné, 1758)	VU	VU	D1	PC	→
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i> (Linné, 1766)	LC	VU	D1 C1	Vd	↘
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i> (Linné, 1758)	VU	VU	D1	PC	↘
Milan noir	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	NT	LC		Va	↗
Buse variable	<i>Buteo buteo</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	→
Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	LC	NT	pr. A2a	Vd	↘
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	LC	LC		PC	?
Petit-duc scops	<i>Otus scops</i> (Linné, 1758)	EN	VU	EN (D) (-1)	Va	↗
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	→
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	EN	EN	D	PC	→
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	→
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	→
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	→
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i> Linné, 1758	NA ^b	VU	EN (D) (-1)	Vp	↗
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i> Linné, 1758	CR	CR	D	PC	?
Pic mar	<i>Dendropicos medius</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	↗
Pic épeichette	<i>Dryobates minor</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	?
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	↗
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	?
Pic vert	<i>Picus viridis</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	↘
Pic cendré	<i>Picus canus</i> J. F. Gmelin, 1788	CR	CR	D	PC	↘
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	↘
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	→
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771		VU	EN (D) (-1)	E	↗
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	?
Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i> J. F. Gmelin, 1788	RE	RE		PC	
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i> Linné, 1758	RE	RE		PC	
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i> Linné, 1758	CR	CR	D	PC	→
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	↗
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	↗
Pie bavarde	<i>Pica pica</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	→
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	↗
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	?
Corneille noire	<i>Corvus corone</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	→
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i> Linné, 1758	RE	NA ^b		Vp	
Mésange noire	<i>Periparus ater</i> (Linné, 1758)	VU	EN	D	Vd	↘
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	→
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i> (Linné, 1758)	DD	DD		PC	↘
Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i> (Conrad von Balenstein, 1827)	EN	RE		Vd	↘
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	→
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	↗

NOM VERNACULAIRE	NOM SCIENTIFIQUE	LR PDL NICHEUR (2014)	LR PDL NICHEUR (2026)	Critères	Changement de catégorie*	Tendance
Panure à moustaches	<i>Panurus biarmicus</i> (Linné, 1758)	VU	EN	D	Vd	↘
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	↗
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i> Linné, 1758	NT	NT	pr. A2ab	PC	↘
Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i> (Linné, 1758)	NT	VU	C1	Vd	↘
Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814)	CR	RE		Vd	↘
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i> (Linné, 1758)	LC	DD		NVcd	?
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i> Linné, 1758	LC	VU	A2ab	Vd	↘
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i> (Linné, 1758)	LC	NT	pr. A2ab	Vd	↘
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	LC	LC		PC	↗
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	?
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	NT	NT	pr C1	PC	↘
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	VU	VU	D1	PC	→
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linné, 1758)	VU	EN	C1	Vd	↘
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	LC	LC		PC	→
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linné, 1758)	CR	CR	C2a(ii)	PC	↘
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	↘
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	LC	VU	C1	Vd	↘
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	EN	CR	D	Vd	↘
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	LC	LC		PC	→
Locustelle lusciniôide	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	EN	VU	C1	Va	↘
Locustelle tachtée	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	DD	VU	D1	NVca	↘
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	LC	LC		PC	↗
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	↗
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	LC	NT	pr. A2ab	Vd	↘
Fauvette babillarde	<i>Curruca curruca</i> (Linné, 1758)	VU	EN	D	Vd	?
Fauvette grisette	<i>Curruca communis</i> Latham, 1787	LC	NT	pr. A2ab	Vd	↘
Fauvette pitchou	<i>Curruca undata</i> (Boddaert, 1783)	VU	NT	pr. D1	Va	↗
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	LC	LC		PC	↗
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i> (Linné, 1758)	LC	NT	pr. A2ab	Vd	↘
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linné, 1758)	LC	NT	pr. A2ab	Vd	↘
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	↗
Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i> Linné, 1758	NT	VU	D1	Vd	?
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i> C. L. Brehm, 1820	LC	LC		PC	→
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	→
Merle noir	<i>Turdus merula</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	↘
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	LC	LC		PC	↗
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i> Linné, 1758	LC	NT	pr. A2ab	Vd	↘
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	LC	LC		PC	?
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	↗
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	↗
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	LC	LC		PC	↗
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	LC	LC		PC	→
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	↗
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i> (Linné, 1758)	EN	EN	C1	PC	↘
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i> (Linné, 1766)	NT	LC		Va	↗
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linné, 1758)	CR	CR	B1ab(v) C2a(ii) D	PC	↘
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	↗
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i> (Linné, 1758)	VU	EN	A2a C1	Vd	↘

NOM VERNACULAIRE	NOM SCIENTIFIQUE	LR PDL NICHEUR (2014)	LR PDL NICHEUR (2026)	Critères	Changement de catégorie*	Tendance
Moineau souldie	<i>Petronia petronia</i> (Linné, 1766)	CR	CR	D C2a(i,ii)	PC	↘
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	↘
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	?
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	LC	LC		PC	→
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	→
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i> (Linné, 1758)	EN	EN	D	PC	→
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i> (Linné, 1758)	EN	VU	D	Va	↘
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	↗
Pipit maritime	<i>Anthus petrosus</i> (Montagu, 1798)	VU	VU	EN (D) (-1)	PC	→
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i> Linné, 1758	LC	LC		PC	↘
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linné, 1758)	LC	LC		PC	↗
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linné, 1758)	EN	EN	C1	PC	↘
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i> (Linné, 1758)	NT	EN	A2ab	Vd	↘
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i> (Linné, 1758)	VU	NT	VU (A2ab) (-1)	Va	↘
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i> Linné, 1758	VU	EN	D	NVm	?
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i> (Linné, 1758)	NT	NT	pr. A2ab	PC	↘
Serin cini	<i>Serinus serinus</i> (Linné, 1766)	NT	NT	pr. A2ab	PC	↘
Tarin des aulnes	<i>Spinus spinus</i> (Linné, 1758)	NA ^b	NA ^b		PC	
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i> (Linné, 1758)	VU	LC		Va	↗
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i> Linné, 1758	EN	EN	A2ab	PC	↘
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i> Linné, 1758	RE	RE		PC	
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i> Linné, 1766	LC	LC		PC	↘
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linné, 1758)	NT	EN	A2a	Vd	↘

Citation : Marchadour B., Arcanger J.-F., Batard R., Beslot E., Boileau N., Bouton F.-M., Montfort D., Paineau G., Raitière W., Sudraud J., Yésou P. & You T., 2025. *Liste rouge des oiseaux des Pays de la Loire. Volet populations nicheuses. Version synthétique*. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, 5 p.

*Changement de catégorie :

- Va/Vd = changement véritable du statut de menace (a : amélioration, d : détérioration)
- Vp = changement véritable du statut de présence de « occasionnelle » (NA^b) vers « régulière » (CR à DD) ou inversement
- NVc = changement non véritable lié à l'amélioration des connaissances sur l'espèce
- NVt = changement non véritable lié à un changement taxinomique
- NVe = changement non véritable lié à une erreur d'évaluation antérieure
- NVm = changement non véritable lié à un changement d'appréciation de la méthodologie ou un changement de la méthodologie
- NVca/NVcd = changement lié à une amélioration des connaissances (DD vers une autre catégorie ou inversement)
- NVia / NVid = changement du statut d'indigénat (NA^a vers une autre catégorie ou inversement)
- E = nouvelle évaluation, entrée d'une nouvelle espèce dans la Liste rouge
- PC (Pct) = pas de changement de catégorie (ou seulement du périmètre taxinomique)

